

CAPITULO 3

DIMENSIONES GLOBALES DEL CONSUMO DE DROGAS

Desde su fundación CEDRO ha venido llevando a cabo estudios epidemiológicos a fin de efectuar el diagnóstico del consumo de drogas por la población urbana, a nivel nacional. Como antecedente de este tipo de estudios sólo se encuentra el llevado a cabo en Lima por Carbajal y col. antes de que se iniciara la epidemia de consumo de pasta básica de cocaína.

En los diversos estudios se ha determinado la prevalencia de vida es decir si la persona había consumido alguna sustancia por lo menos una vez en su vida, además se determinó el uso actual definido como el uso en el último mes y en el uso reciente, el efectuado en el último año.

Las variables que se han considerado han sido:

- El sexo.**
- La edad**, al comienzo de los 12 a los 45 años y posteriormente se ha ido alargando esta variable hasta llegar en el presente a los 64 años con el fin de mantener un seguimiento de las cohortes correspondientes.
- Estado civil**, considerando soltero, casado, conviviente y sin pareja actual
- Nivel de instrucción en tres categorías:** hasta primaria, hasta secundaria y hasta superior
- Ocupación actual:** Clasificar la ocupación siempre ha constituido un problema. En el cuestionario se pusieron como alternativas: Agricultor, Comerciante, Empleado público, Profesional independiente, Militar / policía, Obrero, Técnico, mecánico o carpintero, Estudiante. Ama de casa y Otros. Dada la dispersión encontrada se les agrupó de un modo que no resulta muy satisfactorio y que considera Población económicamente activa (PEA) separada en profesionales / empleados y comerciantes / oficios menores. La población no económicamente activa (No PEA) se ha separado en estudiantes, amas de casa y otros
- Lugar de residencia.** Dada la estructura poblacional se ha separado Lima y provincias. Esta última subdividida en Costa (resto de la Costa sin considerar Lima) Sierra y Selva.
- El estrato socioeconómico** se ha tratado de discernir mediante 13 variables, llegándose al final a una clasificación en dos categorías, bajo y medio / alto.

Las características de los estudios llevados a cabo por CEDRO se presentan en la Tabla 3-1.

Para este estudio se han seleccionado 7 ciudades representativas con un total de 2400 viviendas.

Tabla 3-1 Estudios epidemiológicos – CEDRO. Principales características

| Años | 1986 | 1988 | 1992 | 1995 | 1997 | 2001 |
|-----------------------|---|--|--|---|---|--|
| Edad | 12 a 45 años | 12 a 50 años | 12 a 50 años | 12 a 50 años | 12 a 50 años | 12 a 64 años |
| Nº de ciudades | 40 ciudades | 30 ciudades | 15 ciudades | 20 ciudades | 13 ciudades | 7 ciudades |
| Ciudades | Lima Trujillo Tacna Arequipa Tarapoto Iquitos Cuzco Huancayo | Lima Trujillo Tacna Arequipa Iquitos Cuzco Huancayo Pucallpa Chiclayo Ica | Lima Trujillo Tarapoto Iquitos Cuzco Tingo Maria Ica | Lima Trujillo Tacna Arequipa Ayacucho Tarapoto Iquitos Cuzco Huancayo Tingo Maria Pucallpa Chiclayo Ica | Lima Trujillo Tacna Arequipa Ayacucho Tarapoto Iquitos Cuzco Huancayo Tingo Maria Pucallpa Chiclayo Ica | Lima Trujillo Tacna Arequipa Ayacucho Tarapoto Iquitos |
| Lima | 1240 hogares | 1800 viviendas | 598 viviendas | 900 viviendas | 400 viviendas | 1260 viviendas |
| Provincias | 3760 hogares | 6100 viviendas | 1537 viviendas | 6400 viviendas | 1500 viviendas | 2400 viviendas |

En la tabla 3-2 se muestra la prevalencia de vida para las diversas drogas, considerando sólo a las personas de hasta 50 años. Se incluye también como referencia el estudio de 1986 que consideró edades hasta los 45 años y el efectuado por CONTRADROGAS en 1998 que incluyó población de 12 a 64 años.

Puede observarse el consumo elevado de las llamadas drogas sociales, alcohol y tabaco. De las drogas ilícitas sólo tienen significación la marihuana que se mantiene como la más consumida, con un porcentaje entre 5 y 8%. La Pasta básica de cocaína viene siendo consumida por alrededor del 3% y el clorhidrato de cocaína se coloca en alrededor del 2% para la población general. Como puede verse al analizar la distribución de acuerdo a las diversas variables estos porcentajes se elevan a niveles a veces muy altos para grupos específicos por edad, sexo, nivel de instrucción o clase socioeconómica.

Tabla 3-2 Prevalencia de vida - Uso alguna vez en la vida

| Total | 1986 (CEDRO) | 1988 (CEDRO) | 1992 (CEDRO) | 1995 (CEDRO) | 1997 (CEDRO) | 1998 (Contradrogas) | 2001 (CEDRO) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Alcohol | 87.2 | 83.5 | 92.0 | 84.6 | 88.3 | 93.5 | 85.7 |
| Tabaco | 67.4 | 57.2 | 66.0 | 62.1 | 62.4 | 71.0 | 62.8 |
| Marihuana | 8.3 | 5.3 | 7.8 | 6.4 | 8.6 | 5.2 | 6.6 |
| PBC | 4.0 | 2.8 | 5.6 | 3.1 | 4.9 | 3.4 | 2.7 |
| Cocaína | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 1.4 | 2.0 |

En las secciones que siguen se analizan los resultados considerando las drogas individualmente o en grupos según el significado de los resultados. Como en oportunidades anteriores la base de datos que permite el cruce de las diversas variables y análisis más sofisticados se encuentra en CEDRO a disposición de los investigadores interesados en el tema.

La Tabla 3-3 muestra las principales características encontradas en la población investigada.

Tabla 3-3 Principales características encontrados en la población investigada.

| N Expandido = 5249793 | | |
|-------------------------------------|----------|------------|
| CARACTERISTICAS | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| Sexo | | |
| Masculino | 2376338 | 45.3 |
| Femenino | 2873454 | 54.7 |
| Total | 5249793 | 100.0 |
| Edad | | |
| 12 - 18 | 1222737 | 23.3 |
| 19 - 24 | 771561 | 14.7 |
| 25 - 29 | 709807 | 13.5 |
| 30 - 39 | 1018190 | 19.4 |
| 40 - 49 | 836135 | 15.9 |
| 50 a 64 | 691363 | 13.2 |
| Total | 5249793 | 100.0 |
| Estado Civil | | |
| Soltero | 2573035 | 49.3 |
| Casado | 1739108 | 33.3 |
| Conviviente | 721435 | 13.8 |
| Sin pareja actual | 189979 | 3.6 |
| Total | 5223556 | 100.0 |
| Grado de Instrucción | | |
| Ninguno | 29296 | 0.6 |
| Pre-escolar | 15236 | 0.3 |
| Primaria | 574849 | 11.0 |
| Secundaria | 2720071 | 51.9 |
| Universitario completa | 719258 | 13.7 |
| Universitario incompleta | 502428 | 9.6 |
| No universitario completa | 470931 | 9.0 |
| No universitario incompleta | 202093 | 3.9 |
| Sin informacion | 11247 | 0.2 |
| Total | 5245410 | 100 |
| Ocupacion | | |
| Estudiante | 1534601 | 29.4 |
| Ama de casa | 1023218 | 19.6 |
| Comerciante | 543071 | 10.4 |
| Empleado público | 505468 | 9.7 |
| Profesional independiente | 471489 | 9.0 |
| Obrero | 283619 | 5.4 |
| Técnico (mecánico, carpintero, etc) | 238393 | 4.6 |
| Militar/ policía | 54892 | 1.1 |
| Agricultor | 33518 | 0.6 |
| Otros | 531573 | 10.2 |
| Total | 5219841 | 100 |
| Region de Residencia | | |
| Lima | 3930508 | 74.9 |
| Provincias | 1319285 | 25.1 |
| Resto Costa | 447033 | 8.5 |
| Sierra | 534541 | 10.2 |
| Selva | 337711 | 6.4 |
| Total | 5249793 | 100.0 |
| Estrato Socioeconomico | | |
| Bajo | 4887009 | 93.1 |
| Medio/ Alto | 362783 | 6.9 |
| Total | 5249793 | 100.0 |

